



2014-01-23

## Fårhälsovårdens råd angående stora leverflundran vid inköp av avelsdjur

För att inte riskera att få in stora leverflundran i din besättning bör vissa försiktighetsåtgärder vidtas. Stora leverflundran finns i stora delar av landet, främst i de södra och sydvästra delarna av Sverige.

### Fråga säljaren

Fråga säljaren om det förekommit stora leverflundran i besättningen som sjukdomsregistrering vid slakt (kod 79-80), vid träckprovsanalys eller i samband med obduktion av djur. Observera att vissa slakterier inte lämnar ut sjukdomsregistreringar vid slakt så du måste försäkra dig om att detta verkligen görs.

### Avmaska baggen

Om köparen vet att stora leverflundran förekommer i säljarbesättningen eller om information från säljaren saknas bör avelsdjuren avmaskas i karantän. Preparat verksamma mot stora leverflundran är t.ex. Fasinex, Triclafas eller Valbazen®.

Fasinex och Triclafas tar alla stadier av stora leverflundran och är därmed förstahandsval vid karantänsavmaskning. Båda preparaten är licenspreparat och Fårhälsovården kan tillhandahålla recept. Avmaskningen bör ske tidigast 2 veckor efter senaste betestillfälle i säljarbesättningen. Ägg som producerats innan behandling kan lagras i gallgångar och gallblåsa och kan påvisas upp till 3 veckor efter behandling. Baggen bör därför hållas i karantän på stall tre veckor efter behandling.

Valbazen® har endast effekt mot de vuxna flundrorna och om detta preparat används kan avmaskning tidigast ske ca 3 månader efter installning. Avelsdjuren ska inte släppas ut på bete förrän tidigast 2 veckor efter avmaskning. Observera att förhöjd dos (4 ml/10 kg) ska användas.

Mer information om stora leverflundran finns på [www.svdhv.se](http://www.svdhv.se)

